

Geachte mevrouw/heer,

U heeft zojuist een afspraak gemaakt voor een evenwichtsonderzoek. Graag geven wij u wat meer informatie over dit onderzoek, zodat u rustig en in zekere mate voorbereid het onderzoek kunt ondergaan.

- Als u medicatie neemt voor uw evenwichtsstoornissen moet u deze stopzetten drie dagen voor het onderzoek.
- We raden u aan om juist voor het onderzoek geen zware maaltijd te benutten.
- Gelieve geen schmink (bruine crème of poeder) op het aangezicht te doen.
- Grote oorbellen laat u beter uit.

## 1 Verloop van het onderzoek

- Eerst wordt de huid ontvet met behulp van een scrub en ether.
- Nadien worden 3 elektroden gekleefd: één naast elk oog en één midden op het voorhoofd.
- Tijdens het onderzoek vragen wij u om enkele eenvoudige opdrachten uit te voeren.

## 2 Wat wordt er onderzocht?

Het evenwichtssysteem kan niet rechtstreeks onderzocht worden zoals dat het geval is met het gehoor. Daarom gaan we meten hoe uw evenwichtsorganen werken door uw oogbewegingen te registreren.

Die oogbewegingen lokken wij uit door u een aantal opdrachten te laten uitvoeren: een lichtpunt volgen met de ogen, uw stoel heen en weer laten bewegen, de oren irrigeren met warm en koud water, ...

Duur: ± 1 uur.

## 3 Van wie krijgt u de resultaten?

De resultaten worden aan uw behandelende Neus-Keel-Oorarts bezorgd.

Tijdens een volgende consultatie of meteen na het onderzoek wordt het resultaat en een eventuele behandeling besproken. Hiervoor maakt u zelf een afspraak bij uw NKO-arts, mocht dit nog niet gebeurd zijn.

## 4 Praktische aandachtspunten

- Hou er rekening mee dat het inschrijven enige tijd in beslag kan nemen. Kom dus tijdig (30 minuten voor het geplande onderzoek) naar het ziekenhuis.
- Breng uw identiteitskaart mee.
- U moet geen geld voorzien. De rekening van het onderzoek wordt later opgestuurd. Als u nog een consultatie heeft bij de dokter, betaalt u die wel ter plaatse.
- Eet voor dit onderzoek niet te veel. Een licht ontbijt of een lichte lunch is aangewezen.
- Stop evenwichtsmedicatie (o.a. Betaserc) drie dagen voor het onderzoek.

